

Rasy zwierząt w Polsce – króliki

PAWEŁ BIELAŃSKI, MAGDALENA WRZECIONOWSKA, DOROTA KOWALSKA

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Rasy średnie – królik rex (RX) – cz. 2

Poniższy, szczegółowy opis cech budowy ciała, typu rasowego został zaczerpnięty z Wzorca Królików wydanego przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt w Likwidacji (Warszawa, listopad 2000 r.)

Najniższa dopuszczalna masa ciała królika w wieku 8 miesięcy i powyżej to 3 kg, najwyższa zaś – 4,8 kg. Przy ocenie samic i samców na wystawie dopuszcza się niższą masę ciała.

Królik rex charakteryzuje się harmonijną budową ciała. Tułów ma walcowaty, lekko wydłużony. Głowa wydłużona, szersza w partii czołowej, mocno osadzona na wyraźnej szyi. Ogon krótki, przylegający do tułowia, uszy stojące, owłosione, zaokrąglone na końcach – ich długość wynosi 11-12 cm.



Królik rex szynszyl

Wszelkie odchylenia od cech rasowych są niedopuszczalne, przy czym uznaje się tak zwane wady małe, które nie eliminują zwierzęcia z dalszej hodowli. Są to na przykład: słabo zaznaczona harmonijna budowa ciała lub szyja, wyraźnie zaznaczone podgardle, słabo owłosione uszy, długość włosów pokrywowych 14-18 mm lub 20-24 mm, niewielkie różnice w barwie okrywy włosowej w stosunku do barwy wzorcowej dla danej odmiany, jak również niewielkie odchylenia w barwie oczu i pazurów lub tylko oczu. Niedopuszczalna jest jednak na przykład masa ciała powyżej 4,8 kg, różnica w długości włosów podszyściowych i pokrywowych przekraczająca 2 mm oraz, w zależności od odmiany, występowanie białych plam lub tzw. pędzelków.

System utrzymania rexów nie różni się od innych ras królików. Klatki są takie same jak dla królików ogólnoużytkowych, jednak należy pamiętać o tym, że



Królik rex kuna brązowa

powinno się im zapewnić możliwie najlepsze warunki pomieszczenia i zoohigieniczne, chroniące przed uszkodzeniem bądź zanieczyszczeniem futra. Dlatego też do hodowli reksów nie zaleca się klatek o głębokiej ściółce, wskazane są natomiast klatki z podłogą rusztową lub z siatki tak, aby miały zawsze czysty spód.

Inną specyfiką hodowli królików futerkowych jest również żywienie, które różni się od żywienia królików mięsnych. Wynika to przede wszystkim z długości okresu produkcyjnego. Króliki mięsne osiągają masę ubojową w wieku około 90 dni, natomiast okrywa włosowa królików futerkowych dojrzewa znacznie dłużej – aż 7-8 miesięcy.

Należy pamiętać, że oprócz futerkowego kierunku użytkowania, który jest typowy dla królików ras krótkowłosych, w niektórych krajach rexy dostarczają również mięsa. Ich tuszki nie odbiegają pod względem umięśnienia od tuszek królików innych ras, a mięso ma podobne walory smakowe.



Królik rex ryś