

z gorzelnii majątkowej w ilości 2—3 garści na kojec warchlaków, liczący od 8 do 12 sztuk, które zjadały ją bardzo chętnie. Stwierdzono w krótkim czasie zdrowszy wygląd skóry, lepsze samopoczucie, zmniejszenie śmiertelności i zwiększenie przyrostu na wadze.

Szlaka jest artykułem odpadkowym, powstałym przede wszystkim po spaleniu koksu, rzadziej węgla. Rolnicy używają szlaki do poprawienia nawierzchni podwórzy i dróg polnych.


Z obserwacji klinicznych wynika, że szlaka może mieć też zastosowanie jako uzupełnienie brakujących składników w karmie trzody chlewnej. Należy przypuszczać, że także inne schorzenie na tle głodu mineralnego jak lizawka, ciała obce u przeżuwaczy, łykawość koni, nie mówiąc już o anemii, mogą być leczone pomyślnie zadawaniem szlaki. Wskazaniem byłoby przeprowadzenie badań naukowych czy użycie szlaki do wyrobu mączek mineralnych i zastosowanie ich jako dodatku do paszy przede wszystkim dla trzody chlewnej może znaleźć zastosowanie.

DR TEODOR PUSTÓWKA

Mysłowice

PRZYPADK JEDNORACICOWOŚCI U ŚWINI

Nowoczesna biologia, oparta na materialistycznym poglądzie patrzenia na świat przyrody, udowodniła fakt zmienności ewolucyjnej gatunków zwierzęcych. Jednym z takich przyczynków zmienności gatunków zwierzęcych, jest zaobserwowana jednoracicowość u świni. Podczas badania transportów trzody chlewnej w ilości kilkadziesiąt tysięcy sztuk w ciągu kilkunastu lat, na byłej Centralnej Targowicy w Mysłowicach, a obecnie w Bazie Centrali Mięśnej, natrafiłem ostatnio na sztukę, u której wszystkie racice tak na przednich jak i na tylnych kończynach były ukształtowane w postaci puszek jednoracicowych, zamiast normalnych puszek rogowych dwuracicznych.



1) Nieprawidłowe jednoraciczne puszki rogowe u świni.

Sztuka ta razem z innymi została poddana ubojowi. Gdyby Zakłady Mięsne zgodziły się na pozostawienie świni tej (maciorki) przy życiu, mogłaby posłużyć do przeprowadzenia ciekawego doświadczenia, opartego na nauce Miczurina i Lysenki, czy nie dałoby się od świni takiej uzyskać potomstwa o kończynach jednoracicowych, zamiast dwuracicznych.



2) Nieprawidłowa jednoraciczna puszka (w środku) po bokach prawidłowe dwuraciczne puszki rogowe u świni.

Załączone fotografie 1, 2 przedstawiają opisany wypadek racic jednokopytowych u świni.

ORGANIZACJA SŁUŻBY WETERYNARYJNEJ

STANISŁAW WADOWSKI

Chełm Lub.

UDZIAŁ SŁUŻBY WETERYNARYJNEJ W LICENCJONOWANIU ROZPLODNIKÓW.

Racjonalizacja hodowli zwierząt gospodarskich oraz nadawanie pracy hodowlanej w tym zakresie ciągłości i jednolitości jest treścią ustawy o państwowym nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec, oraz takiej samej ustawy w zakresie hodowli koni. Tekst ustawy i odnośne zarządzenia Ministra Rolnictwa w dziale bydła, trzody chlewnej i owiec są podane w Dz. U. R. P.

z dnia 28.X.1925 r. Nr 10, poz. 69

z dnia 5.III.1934 r. Nr 40, poz. 349

z dnia 25.III.1946 r. Nr 32, poz. 203

Ustawę i zarządzenia Ministra Rolnictwa w dziedzinie hodowli koni podają Dz. U. R. P.

z dnia 15.IX.1934 r. Nr 32 poz. 284

z dnia 20.VII.1935 r. Nr 52 poz. 339

z dnia 29.III.1946 r. Nr 9 poz. 67

z dnia 6.VI.1946 r. Nr 23 poz. 154

z dnia 8.VIII.1947 r. Nr 52 poz. 279.

Kamieniem węgielnym tych ustaw jest punkt stwierdzający, że pokrywanie cudzych krów, świń i owiec oraz klaczy jest dozwolone tylko rozplodnikiem uznany dla danego obwodu. Do orzekania o uznaniu rozplodników za odpowiednich do hodowli i wydawania świadectwa uznania właścicielom wybranych rozplodników są powoływane komisje kwalifikacyjne. W skład komisji kwalifikacyjnej bydła, trzody chlewnej i owiec wchodzi 3 członków i 3 zastępców. Jednym z tych członków jest powiatowy lekarz wet. powołany do składu komisji przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Komisja przegląda doprowadzony materiał i wybiera z niego najlepsze i najbardziej odpowiadające potrzebom miejscowej hodowli zwierzęta. Do ważności orzeczenia komisji kwalifikacyjnej jest potrzebna obecność 3 członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy oraz bezwzględnie lekarza weterynarii. Trzecim członkiem winien być delegat sektora społecznego. W zespole tym nala lekarza weterynarii jest decydująca i bez jego udziału nie może zapasć wiążąca decyzja odnośnie przeglądanych rozplodników.

Inaczej działa komisja kwalifikacyjna w dziale koni. Ustawa mówi, że komisja składa się z trzech osób i działa w obecności powiatowego lekarza weterynarii, (Dz. U. R. P. z dnia 8.VIII.1947 r., poz. 279 art. 4 punkt 6). Trudno powiedzieć, co właściwie myślał ustawo-