

STANISŁAW TRAWKA

Koźle

CIAŁO OBCE UMIEJSCOWIONE W ROGU MACICY KROWY WSKAZANIEM DO OTWARCIA JAMY BRZUSZNEJ

Zgłoszono przypadek złamania szklanej pipety przed 12 godzinami w czasie unasienniania krowy. Złamany odcinek tkwił początkowo w szyjce macicznej i na skutek manipulacji wykonywanych przez inseminatora pipeta przesunęła się do wnętrza macicy. Badaniem klinicznym stwierdzono niepokój zwierzęcia, wzmożone parcia połączone z częstym oddawaniem moczu. Ustalono, że pipeta tkwi w prawym końcowym odcinku rogu macicy. Biorąc pod uwagę niemożność wydostania jej w początkowym okresie ze względu na wysoką wartość hodowlaną zwierzęcia postanowiono otworzyć jamę brzuszną. Zwierzę operowano w pozycji stojącej w znieczuleniu nadoponowym niskim 2% roztworem polokainy i nasiękowym miejsca operacji. Cięcie wykonano w prawej słabiznie długości 20 cm. Po otwarciu jamy brzusznej prawą ręką wprowadzano do jamy brzusznej i po ustaleniu miejsca utkwienia pipety nacięto macicę w końcowym jej odcinku prawego rogu na długości 2 cm z łatwością usuwając odłamany odcinek pipety. Miejsce nacięcia zamknięto węzełkowymi szwami przerywanymi. Jamę brzuszną zeszyto następującymi szwami: otrzewną — szwem ciągłym węzełkowym; mięśnie — szwem węzełkowym pojedynczym; skórę szwem materacowym. Rana zagoiła się doraźnie.

Krowa po przebytej operacji odzyskała pełną wartość hodowlaną i użytkową.

Adres autora: lek. wet. Stanisław Trawka, Koźle, ul. Piastowska 77, woj. Opole.

ZDZISŁAW MACIEJASZEK

Tuchola

PRZYPADEK OPERACYJNEGO WYLECZENIA NIEDROŻNOŚCI OKRĘŻNICY DUŻEJ, Z WTÓRNYM PĘKNIĘCIEM ODBYTNICY

Koń wałach, kasztan, lat 8, wagi ok. 450 kg (poz. ks. klin. 171/67) zachorował dnia 29.XI.1967 r. wieczorem. Objawy: niepokój, grzebanie kończynami, brak apetytu, kał oddawany w małej ilości, a po kilkunastu godzinach stwierdzono brak defekacji.

Badaniem w dniu 30.XI.1967 r. stwierdzono: temp. 38,6°, tętno 52, oddechy 18, oraz zatkanie górnego pokładu okrężnicy dużej lewej na znacznej przestrzeni. Przez trzy dni stosowano leczenie zachowawcze. W dniu 3.XII.1967 r. stan zdrowia konia pogorszył się (temp. 38,3°, tętno 72, oddech 12, głowa pochylona, drżenie mięśni, odbyt i pięty powalane krwią). Badaniem przez odbył stwierdzono pęknięcie dolnej części odbytnicy, długości 15 cm, w miejscu przejścia okrężnicy małej w odbytnicę.

Postanowiono wykonać zabieg operacyjny, wychodząc z założenia, że zaistniało dwojakiego rodzaju wskazanie do szybkiej interwencji chirurgicznej. Pierwotne, którym było zatkanie górnego pokładu okrężnicy lewej i wtórne — pęknięcie prostnicy. Po przygotowaniu pola operacyjnego w okolicy biodrowej lewej, wykonano znieczulenie ogólne wodziannem chloralu i miejscowe 2% roztworem polokainy. Jamę brzuszną otwarto z cięcia w lewym przyłędźwiowym dole, w połowie wysokości między guzem biodrowym, a stawem kolanowym, równoległe do linii przeprowadzonej od guza biodrowego do sie-

deniowego. Zbitej części czopu nie udało się przeprowadzić wewnątrz okrężnicy, dlatego niedrożną część lewego górnego pokładu, wyjęto z jamy brzusznej. Otrzewna trzewna, w miejscu niedrożnym, była bardzo przekrwiona, a jelito w nieznacznym stopniu pokryte kałem i strzępami włókniaka. Cięcie ściany jelita wykonano równoległe do jego osi długiej powyżej miejsca niedrożnego. Treść jelita usunięto, a ścianę zamknięto szwami jelitowymi. Następnie wydobyto część dolną pokładu okrężnicy lewej, również niedrożną i operacyjnie opróżniono. Kolejnym etapem operacji było zszycie pękniętej odbytnicy. Asystujący wprowadził rękę do jamy brzusznej i przesunął pękniętą odbytnicę w kierunku odbytu. Wówczas można było uchwycić ręką, wprowadzoną do prostnicy, brzegi rany, kciukiem i palcem środkowym podciągając część prostnicy w kierunku odbytu. Na zbliżony odcinek rozdartej prostnicy założono pierwsze dwa szwy węzełkowe, nieco poniżej miejsca pęknięcia pozostawiając długie końce jedwabiu. Teraz wprowadzono rozwieracz Polańskiego. Asystujący jedną ręką ustalał rozwieracz, a drugą pociągał końce jedwabiu założonych szwów, na tyle by można było założyć następne szwy węzełkowe, przebijające błonę śluzową, mięśniową i surowiczą. W ten sposób zszyto pękniętą odbytnicę. Operacja została zakończona zamknięciem powłok brzusznych. Po operacji podano zgłębnikiem 30 ml 32% roztworu wodnego formaldehydu w 750 ml wody. Osłone antybiotykową stosowano przez 7 dni. Wodny roztwór formaldehydu podawano przez 3 dni. Pierwsza defekacja nastąpiła w nocy po operacji. Po 36 godzinach po operacji, koń otrzymał poidło w postaci wywaru nasion lnu i 0,5 kg dobrego siana. Ilość podawanego siana zwiększano w następnych dniach. Rana powłok brzusznych zagoiła się doraźnie, a szwy prostnicy były na całej długości pokryte ziarniną i ściśle zamkły rane. Koń pozostawał pod obserwacją przez 21 dni. Leczenie operacyjne tego przypadku zakończyło się pomyślnie.

Adres autora: lek. wet. Zdzisław Maciejaszek, Tuchola, ul. Chojnicka 65.

JAN SZYMCZAK

Boniewo

KAMIEŃ PĘCHERZA MOCZOWEGO U KLACZY

W dniu 7 maja 1968 r. rolnik M. F. doprowadził do PZLZ Boniewo klacz siwą, 10 lat, zapisaną do ksiąg koni zarodkowych.

W wywiadzie podał, że od około 7 miesięcy obserwuje u klaczy częste napinanie się do oddawania moczu. Mocz oddawany jest małymi porcjami. Chód u klaczy jest sztywny. Po krótkim biegu konia mocz stale wypływa i zawiera domieszkę krwi. Objawy z biegiem czasu nasilają się. Apetyt i pragnienie zachowane. Objawów morzyskowych nie zauważył. Klacz każdego roku rodzi źrebaka i obecnie od miesiąca jest pokryta. W grudniu 1967 r. klacz była leczona w tym kierunku (stosowano zastrzyki i płukanie pochwy). Leczenie nie dało poprawy. Do ponownego leczenia skłoniły właściciela nasilone objawy ze strony narządu moczowego oraz zauważenie chudnięcia mimo intensywnego odżywiania klaczy.

Badanie kliniczne wykazało: ciepota wewnętrzna 37,8° C., tętno 40/min., oddechy 12/min. Spojówki nastrzykane w wyraźnie zaczerwienione. Zachowanie w spoczynku spokojnie. Chód ostrożny i sztywny. Badanie *per vaginam*: błona śluzowa pochwy zaczerwieniona, a cewki moczowej rozpułchniona. Sama cewka moczowa rozszerzona (swobodnie wchodzi dwa palce). W pęcherzu moczowym wyczuwalny twór kamieniowato twardy, okrągły, szorstki i ruchomy,